



Памятка для пациента

принимающего Аровабан® (ривароксабан)
Изварино Фарма по показанию
«Профилактика инсульта и системной
тромбоэмболии у пациентов с неклапанной
фибрилляцией предсердий»*

Материал одобрен Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**Только по назначению врача.*

Режим дозирования Аровабана® для профилактики инсульта и системной тромбоэмболии при фибрилляции предсердий



Аровабан® 1 таблетка 20 мг 1 раз в день
вместе с приемом пищи

ДЛИТЕЛЬНО



Пациентам с нарушением функции почек
рекомендовано **снижение дозы**

Степень нарушения	Кл Кр, мл/мин	Рекомендуемая доза
Средняя	15 - 29	15мг 1 раз/день
Тяжелая	30 - 49	15мг 1 раз/день с осторожностью
Терминальная	< 15	Не рекомендуется



Стоимость месячного курса терапии одинакова для всех дозировок



всегда 1 раз в день –
просто и удобно



Во время приема пищи

**20 мг/
15 мг**

Большинству рекомендован
в полной дозе*



Не требуется коррекции дозы
в зависимости от **возраста и веса**

*Снижение дозы по критериям согласно общей характеристике лекарственного препарата Аровабан®



Более 15-ти лет опыта производства лекарственных препаратов с заботой о пациентах

○ Трансплантология (Лироктас® такролимус)

○ Онкология (более 30-ти препаратов)

○ ВИЧ (Лопирита® лопинавир + ритонавир)

○ **Кардиология (более 20-ти препаратов)**

○ и другие препараты для жизненно важных терапевтических областей

1. РКИ № ВЕ-21072022-RIV20IZ от 02.10.2023 г. Исследование сравнительной биодоступности/биоэквивалентности исследуемого препарата – Ривароксабан таблетки, покрытые п/о, 20 мг (ООО «Изварино Фарма», Россия) и референтного препарата.

2. Общая характеристика лекарственного препарата Аровабан®

Материал предназначен для специалистов системы здравоохранения

Узнайте больше о
компании по QR-коду

